

五氯酚酸钠胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YPYK-45

概要

五氯酚酸钠(sodium pentachlorophenoxyde, PCP)是一种有机农药，在自然环境中降解缓慢，可通过饲料等途径进入畜禽体内并产生蓄积，从而导致动物性食品中出现残留现象，对人体带来了严重的危害。可导致人体中枢神经系统、血液、肝、肾损伤及内分泌紊乱等症状，我国严格禁止在动物食品生产中含有该药物。本产品适用于企业、检测机构、监督部门等各类现场快速检测。

检测原理

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成，用于检测样本中五氯酚酸钠。样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的五氯酚酸钠与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上五氯酚酸钠偶联物结合。根据T线与C线的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于组织中五氯酚酸钠残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检测限

100 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)

试剂盒组成

序号	组成	规格	1 次/盒	10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡(内含金标微孔、滴管、干燥剂)	1份	10份	20份	
(2)	稀释液	1瓶	1瓶	2瓶	
(3)	1.5mL检测管	1支	10支	20支	
(4)	1mL吸管	1支	10支	20支	
(5)	说明书	1份	1份	1份	

注意事项

- (1) 每次检样前，剪碎样本的刀具需进行清洗，避免交叉污染。
- (2) 检测环境温度应控制在 18~30°C，温度过高或过低，将影响检测结果。
- (3) 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- (4) 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (5) 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- (6) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- (7) 本产品为一次性产品，请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。
- (8) 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- (9) 产品评价时，若需直接检测标准品，需用试剂盒内的专用稀释液配制。
- (10) 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方，请勿食用配备的试剂。
- (3) 实验所用全部物品，应用完毕后应妥善处理，勿让儿童接触。
- (4) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (5) 实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- (6) 请勿食用配备的试剂。

贮藏条件及有效期

- (1) 贮藏条件：2-30°C避光保存，勿冷冻。
- (2) 有效期：12 个月。

五氯酚酸钠胶体金快速检测卡使用说明书

需自备的工具



天平 (精度 0.01g)



匀质器



剪刀



离心管



移液器 (0.2mL, 1mL)



涡旋仪




计时器

样本前处理步骤


(1) 取切碎的一定量的去脂肪组织样品，用均质机均质。



(2) 称取约 0.25 克均质物于检测管中；加入 1 毫升稀释液。




(3) 剧烈振荡 1 分钟，室温下 4000 转/分钟离心 5 分钟，上层清液作为待测液。




样本检测步骤


(1) 从原包装袋中取出检测卡、金标微孔和滴管，放于平整、洁净的台面上。




(2) 用移液器或滴管吸取 120 μ L (约 4 滴) 待测液，滴加到金标微孔中，用滴管或移液器反复吸打以溶解微孔中的红色物质，等待反应 2 分钟。




(3) 吸取微孔中全部液体垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔 (S) 中；液体流动时开始计时，反应 8~10 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。



结果判断



阴性



阳性



无效

(1) 阴性：T 线显色深于或者等于 C 线显色，均表示样本中的待测物浓度低于检出限或无待测物残留。

(2) 阳性：T 线显色浅于 C 线显色，或者 T 线不显色，均表示样本中的待测物浓度等于或高于检出限。

(3) 无效卡：未出现 C 线，表明操作过程不正确或检测卡已失效。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。